



تعمد من، ترک قلیان

هفته ملی

بدون دخانیات

(۴ تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰)

راهنمای ترک دخانیات برای مصرف کنندگان مواد دخانی



سازمان بهداشت ایران
معاونت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری
بخش سلامت عمومی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز سلامت عمومی و
پیشگیری از بیماری‌های مزمن

فهرست

هفته مالم
بدون دخانیات
۱۴۰۰ تا - ۱۴۰۱ خردادماه

۴	مقدمه
۵	آماده شدن برای ترک
۵	اثر استعمال دخانیات بر روی شما، خانواده و دوستان شما
۹	باورهای اشتباه در مورد خطرات سلامتی مصرف دخانیات
۱۱	خطرات سلامتی استعمال دخانیات برای خانواده
۱۲	هزینه مصرف دخانیات برای فردیگاری و خانواده او
۱۳	از نظر مالی مصرف دخانیات هم مالیاتی برای خانواده است
۱۴	پیامدهای اجتماعی مصرف دخانیات برای فردیگاری و خانواده او
۱۵	پاداش های ترک کردن
۱۶	فواید اقتصادی
۱۷	چگونه اعتماد به نفس خود برای ترک را تقویت کنید
۱۸	برنامه ریزی و تلاش برای ترک
۱۹	اثراتری ها و مهارت های غلبه بر موانع مشترک و چالش های ترک
۲۰	درمان های دارویی
۲۱	منابع حمایتی محلی برای ترک دخانیات



هفته‌مه بدون دخانیات

(۳ تا - | خردادماه ۱۴۰۰ |)

مقدمه

این متن خودیاری براساس بسته آموزشی ظرفیت سازی شماره چهار سازمان بهداشت جهانی با عنوان «تقویت سیستم های سلامت برای درمان وابستگی به دخانیات در مراقبت های اولیه» تدوین شده است. مصرف کنندگان مواد دخانی گروه هدف این بسته آموزشی هستند. هدف این بسته آموزشی ارائه توصیه و اطلاعات برای بهبود آمادگی مصرف کننده دخانیات برای ترک است. همچنین این بسته آموزشی به افرادی که برای ترک آماده هستند توصیه و اطلاعاتی ارائه می کند تا برای ترک دخانیات برنامه ریزی کنند. محتوای این بسته خودیاری شامل موارد زیر است:

- ۱) چگونگی آماده شدن برای ترک (برای آن دسته از مصرف کنندگان مواد دخانی که برای ترک آماده نیستند).
- ۲) چگونگی برنامه ریزی و تلاش برای ترک (برای آن دسته از مصرف کنندگان مواد دخانی که برای ترک آماده هستند).
- ۳) منابع حمایتی محلی برای ترک دخانیات



آماده شدن برای ترک

ترک مواد دخانی کار سختی است، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. ما این را درک می‌کنیم که ممکن است شما فکر کنید ترک مواد دخانی مهم نیست یا که نمی‌توانید موفق باشید. در این بسته آموزشی اطلاعاتی در مورد اینکه چرا ترک مواد دخانی مهم است، در اختیار شما، خانواده و دوستان شما قرار می‌گیرد. این اطلاعات شامل این موارد است: خطرات مصرف مواد دخانی برای سلامتی شما و خانواده شما، برای جامعه، برای کیفیت پول شما و فواید ترک مصرف دخانیات. در این بسته آموزشی تعدادی پیشنهاد در مورد چگونگی بهبود اعتماد به نفس در ترک مواد دخانی را ملاحظه خواهید کرد. علاوه بر این پیشنهادات و منابع جایگزینی در مورد چگونگی آمادگی برای تلاش برای ترک دخانیات ارائه شده است.

اثر استعمال دخانیات بر روی شما، خانواده و دوستان شما

استعمال دخانیات دارای اثرات مرتبط با سلامتی و غیرسلامتی برای شما و اطرافیان شما است.

خطرات سلامتی استعمال دخانیات برای مصرف‌کننده مواد دخانی مواد دخانی نیمی از مصرف‌کنندگان خود را می‌کشد، به دلیل اینکه محصولات دخانی از مواد کاملاً سمی تولید می‌شود. دود دخانیات حاوی بیش از ۷۰۰۰ ماده شیمیایی است که حداقل ۲۵۰ مورد از آن مضر و حداقل ۶۹ مورد از آن به عنوان عامل سرطان شناخته شده است. برخی از مواد شیمیایی موجود در دود دخانیات عبارتند از:

● اسید استناریک (برای ساختن موم شمع استفاده می‌شود)

● بوتان (گاز داخل فندک)

● متانول (گازی که به طور معمول برای سوخت جت استفاده می‌شود)

● اسید استیک (جزء مهمی از سرکه)

● هگزامین (یک جز مشترک در روشن‌کننده های کباب پزی)



● متان (گاز فاضلاب)

● نیکوتین (ماده ای اعتیادآور که به طور معمول در حشره کش ها استفاده می شود).

● کادمیوم (ماده اصلی باتری ها)

● آرسنیک (سم)

● تولوئن (حلال صنعتی)

● آمونیاک (جزء سمی مواد شوینده)

● مونواکسید کربن (گاز خروجی از آگروز)

● مصرف دخانیات علت طیف وسیعی از بیماری ها است، از قبیل:

● تنگی نفس

● تشدید آسم

● عفونت های تنفسی

● سرطان (حنجره، دهان، حلق، مری، نای، نایژه ریه، سرطان خون حاد

میلوئیدی، معده، لوزالمعده، کلیه، حالب، روده بزرگ، دهانه رحم و مثانه)

● بیماری عروق کرونر قلب


● حملات قلبی

● سکته



- بیماری انسداد مزمن ریوی
 - پوکی استخوان
 - کوری
 - آب مروارید
 - پریوندنتیت (التهاب لثه)
 - بیماری عروق محیطی آترواسکلروتیک
 - شکستگی های لگن
 - ناباروری (برای کسانی که باردار هستند یا سعی در بارداری دارند، مصرف دخانیات فرد را در معرض خطر زیاد تولد نوزاد با وزن کم قرار می دهد)
 - ناتوانی جنسی
- بیماری هایی که به علت مصرف و مواجهه با دود دسته دوم دخانیات ایجاد می شود:


بیماری های ناشی از مواجهه با دود دسته دوم دخانیات



بیماری‌های که در اثر استعمال دخانیات ایجاد می‌شود

سرطان‌ها

بیماری‌های مزمن





باورهای اشتباه در مورد خطرات سلامتی مصرف دخانیات

بسیاری از افراد سیگاری، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل اینکه داده های گمراه کننده شرکت های دخانیات حقایق واقعی مربوط به مصرف دخانیات را تحریف می کنند، خطرات دخانیات را به طور کامل درک نمی کنند برخی از باورهای اشتباه در مورد استعمال دخانیات عبارتند از:

سیگارهای کم تار (قطرن) مضر نیستند چیزی به نام سیگار بی خطر وجود ندارد. سیگارهای کم قطرن به اندازه سایر سیگارها مضر هستند. اگرچه سیگارهای کم قطرن در یک مدت زمانی طولانی کمتر به ریه های شما آسیب می رسانند، مشخص شده است افرادی که از این نوع سیگارها استفاده می کنند پف های عمیقتر و با تعداد دفعات بیشتری می کشند. در مقایسه با فواید زیاد ترک سیگار، استفاده از سیگارهای کم قطرن فایده ای کمی برای سلامتی دارد.

سیگارهای دست ساز بی خطر هستند مواد دخانی که مصرف کننده خود آن را آماده می کند یا مواد دخانی رولی حاوی بسیاری از مواد شیمیایی مشابه سیگارهای تولید شده در کارخانه است. تحقیقات نشان می دهد که مواد دخانی دست ساز حداقل به اندازه سیگارهای تولید شده در کارخانه یا احتمالاً بیشتر از آن مضر هستند. مطالعات نشان می دهد که مصرف کنندگان سیگارهای دست ساز تمایل دارند سیگارهایی بسازند که می تواند مقادیر زیادی قیر و نیکوتین تولید کند. حتی ممکن است که آنها از فیلتر نیز استفاده نکنند. مصرف کنندگان سیگارهای دست ساز و آنهايي که هر دو نوع سیگار (سیگارهای دست ساز و سیگارهای ساخت کارخانه) را مصرف می کنند استنشاق های عمیق تری را در مقایسه با مصرف کنندگان سیگارهای ساخت کارخانه گزارش می کنند. برای تعیین سطح مواد شیمیایی استنشاق شده توسط سیگاری های دست ساز تحقیقات بیشتری لازم است.

کاهش تعداد سیگار می تواند خطرات سلامتی را کاهش دهد- هیچ سطح امنی برای مصرف سیگار وجود ندارد. برخی از افراد سعی می کنند که با کاهش تعداد سیگارهای مصرفی عادت سیگار کشیدن خود را کم خطرتر کنند، اما این کار برای بیشتر افراد سخت است و سریعاً به عادت قبلی خود برمی گردند. اگرچه کاهش مصرف سیگار کمی خطر را کاهش می دهد، اما ترک سیگار تنها راه برای مزایای سلامتی طولانی مدت است. فقط سه نخ سیگار در روز می تواند باعث بیماری قلبی کشنده شود، زنان به ویژه در معرض خطر هستند.

فقط افراد مسن به خاطر سیگار کشیدن مریض می شوند- هرکسی که مواد دخانی استعمال می کند در معرض خطرات سلامتی استعمال دخانیات است. تمام گروه های سنی از پیامدهای کوتاه مدت استعمال دخانیات رنج می برند. این پیامدها شامل کاهش عملکرد ریه، تنگی نفس، سرفه و خستگی سریع در حین ورزش است. سیگار کشیدن همچنین قدرت بویایی و چشایی را کاهش داده و باعث پیری زودرس پوست می شود. بیماری های مربوط به سیگار کشیدن اغلب طی چندین سال قبل از تشخیص ایجاد می شوند. هرچه مدت بیشتری سیگار بکشید، خطر ابتلا به سرطان، قلب، ریه و سایر بیماری های قابل پیشگیری بیشتر می شود. از آنجا که این بیماری ها پس از گذر یک عمر از زندگی ایجاد می شوند، ظاهراً به نظر می رسد که فقط افراد سالخورده تحت تاثیر استعمال دخانیات هستند. با این حال، افرادی در دهه دوم و سوم زندگی خود در اثر سکنه هایی که به خاطر مصرف دخانیات جان خود را از دست داده اند.

لازم به یادآوری است که صنعت دخانیات این عقاید غلط را منتشر و ترویج می کند تا شما را گیج و گمراه کند، اما اینها غلط است. استعمال دخانیات مضر است.





تعمه من، ترک قلیان



خطرات سلامتی استعمال دخانیات برای خانواده

مصرف خانواده شما را در معرض خطر قرار می دهد. مواجهه با دود دست دوم اعضای خانواده شما را در معرض خطر زیاد بیماری زیر قرار می دهد:

بیماری هایی در بزرگسالان	بیماری هایی در کودکان
تحریک بینی	سندرم ناگهانی مرگ نوزاد
سرطان ریه	بیماری حاد تنفسی
اثرات باروری در زنان (وزن کم نوزاد هنگام تولد)	بیماری گوش میانی
بیماری عروق کرونر قلب	علائم مزمن تنفسی

هزینه مصرف دخانیات برای فرد سیگاری و خانواده او

هزینه مصرف دخانیات برای فرد سیگاری

استعمال دخانیات نه تنها سلامتی شما بلکه ثروت شما را نیز از بین می‌برد. تخمین زده می‌شود. که ۵ تا ۱۵ درصد از درآمد یک فرد سیگاری صرف دخانیات می‌شود، که می‌تواند یک بار سنگین اقتصادی برای شما و خانواده شما باشد. در زیر یک ماشین حساب هزینه آورده شده است که به شما کمک می‌کند دریابید چه مقدار پول برای سیگار صرف کرده‌اید.

ماشین حساب هزینه سیگار کشیدن

تعداد پاکت‌های که در یک سال می‌کشید*	×	تعداد سال‌هایی که سیگار کشیده‌اید	×	قیمت میانگین هر پاکت سیگار	=	مبلغی که در طول عمر برای سیگار هزینه کرده‌اید.
	×		×		=	

* برای تبدیل روز به سال به جدول زیر مراجعه کنید

یک پاکت در روز	یک پاکت و نصف در روز	دو پاکت در روز	دو پاکت و نصف در روز	سه پاکت در روز
۳۶۵ پاکت در سال	۵۴۸ پاکت در سال	۷۳۰ پاکت در سال	۹۱۳ پاکت در سال	۱۰۹۵ پاکت در سال



از نظر مالی مصرف دخانیات هم مالیاتی برای خانواده است

استعمال دخانیات رنج قابل توجهی را برای خانواده‌ها و اشخاصی که با مصرف‌کنندگان دخانیات در ارتباط هستند، تحمیل می‌کند. این رنج خود را به صورت کاهش کیفیت زندگی، مرگ و بار مالی نشان می‌دهد. محصولات دخانی علاوه بر اینکه مضر هستند، گران هم هستند.

پیامدهای اجتماعی مصرف دخانیات برای فرد سیگاری و خانواده او

سیگار کشیدن اثرات منفی بر روری روابط و تعاملات اجتماعی دارد. در بیشتر فرهنگ‌ها، مردم نگرشی منفی به افراد مصرف‌کننده دخانیات دارند. مصرف دخانیات یک انگي به همراه خود دارد (به عنوان مثال، ممکن است مردم فکر کنند که مصرف‌کننده دخانیات بد بو، نفرت انگیز/کثیف، ناسالم و ... هستند). به عنوان یک فرد سیگاری روابط شخصی شما ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد به دلیل اینکه بسیاری از مردم تمایلی به برقراری ارتباط با یک فرد سیگاری ندارند. به عنوان یک فرد سیگاری، احتمال بیشتری وجود دارد که کودکان شما مصرف دخانیات را تجربه کنند و در سنین جوانی مصرف‌کننده حرفه‌ای مواد دخانی شوند.

پاداش‌های ترک کردن

خبر خوب این است که ترک دخانیات، با دستاوردهای فوری و بلند مدت، فواید بزرگی دارد.

فواید سلامتی

ترک کردن به شما کمک خواهد کرد تا اثرات منفی، مرتبط با سلامت و

غیرمرتبط با سلامت، که قبل از این بیان شد را کاهش دهید. ترک کردن، یا تلاش برای ترک، احتمال خطرات طولانی مدت سلامتی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، ترک کردن فواید فوری و طولانی مدت دارد، ترک کردن سال‌هایی را به زندگی شما اضافه می کند.

فواید سلامتی ترک دخانیات

الف: ترک کردن برای تمام مصرف‌کنندگان دخانیات فواید سلامتی فوری و بلند مدت دارد.

زمان شروع ترک	تغییرات مفید سلامتی که رخ می دهد
در مدت ۲۰ دقیقه	ضریان قلب و فشار خون شما به مقدار طبیعی کاهش می یابد.
۱۲ ساعت پس از ترک	کربن مونواکسید موجود در خون شما به مقدار طبیعی کاهش می یابد.
۱۲ - ۲ هفته پس از ترک	جریان خون شما بهبود پیدا می کند و عملکرد ریه های شما افزایش می یابد.
۹ - ۱ ماه پس از ترک	سرفه کردن و تنگی نفس کاهش می یابد.
یک سال پس از ترک	خطر ابتلا به بیماری کرونر قلب تقریباً به اندازه نصف یک فرد سیگاری می شود.
۵ سال پس از ترک	۵ تا ۱۵ سال پس از ترک سیگار خطر سکته مغزی شما به اندازه همین خطر در یک فرد غیرسیگاری کاهش می یابد.
۱۰ سال پس از ترک	خطر ابتلا به سرطان ریه تقریباً به اندازه نصف یک فرد سیگاری کاهش می یابد و خطر ابتلا به سرطان دهان، گلو، مری، مثانه، دهانه رحم و لوزالمعده کاهش می یابد.
۱۵ سال پس از ترک	خطر ابتلاء به بیماری عروق کرونر قلب به اندازه یک فرد غیر سیگاری است.



ب: فوایدی برای تمام سنین و افرادی که تا به حال دچار مشکلات سلامتی مرتبط با استعمال دخانیات شده‌اند. این افراد هنوز می‌توانند از فواید ترک دخانیات بهره ببرند.

زمان ترک کردن	فواید ترک کردن در مقایسه با آنهایی که ترک نکرده‌اند
در حدود ۳۰ سالگی	به دست آوردن تقریباً ۱۰ سال امید به زندگی
در حدود ۴۰ سالگی	به دست آوردن تقریباً ۹ سال امید به زندگی
در حدود ۵۰ سالگی	به دست آوردن تقریباً ۶ سال امید به زندگی
در حدود ۶۰ سالگی	به دست آوردن تقریباً ۳ سال امید به زندگی
بعد از شروع بیماری تهدید کننده زندگی	فواید فوری، افرادی که پس از حمله قلبی دخانیات را ترک می‌کنند ۵۰ درصد احتمال ابتلا به حمله قلبی دیگر را کاهش می‌دهند.

ج: ترک سیگار خطر فراوان بسیاری از بیماری‌های مربوط به دود دست دوم در کودکان را کاهش می‌دهد، مانند بیماری‌های تنفسی (به عنوان مثال، آسم) و عفونت گوش

د: ترک کردن احتمال ناتوانی جنسی، مشکل در بارداری، زایمان زودرس، نوزادانی که وزن کم دارند و سقط جنین را کاهش می‌دهد.

فواید اقتصادی

ترک کردن دخانیات منافع مالی بسیار واضح و ملموسی نیز دارد. ترک کردن پول بیشتری را در جیب شما قرار می‌دهد. تمرین ترک کردن و پس انداز کردن به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید اگر مصرف دخانیات را ترک کنید چه مقدار پول می‌توانید پس انداز کنید.

ترک کن و پس انداز کن

اگر ترک کنید چه مقدار پول می توانید ذخیره کنید؟
تمام پولی که در یک روز برای دخانیات هزینه می کنید
مقدار پولی که در ماه برای دخانیات هزینه می کنید
مقدار پولی که در سال برای دخانیات هزینه می کنید
مقدار پولی که در ۱۰ سال برای دخانیات هزینه می کنید
اگر این پول ها را پس انداز می کردید چه چیزی می توانستید بخرید؟

فواید اجتماعی ترک کردن

احساس انزوای کمتری خواهید کرد ترک کردن به این معنی است که می توانید به هر جایی بروید، نه فقط به جایی که دخانیات مصرف کنید. می توانید روابط خود با خانواده، دوستان و کارفرمای خود را بهبود خواهید بخشید. بهره وری بیشتری خواهید داشت - برای مصرف دخانیات مجبور نیستید مرتباً کاری را که انجام می دهید متوقف کنید. می توانید تعاملات



هفته مله
بدون دخانیات
۱۴۰۱ خردادماه ۱۴۰۰



اجتماعی خود را گسترش دهید. مجبور نیستید که خودتان را محدود به صحبت کردن با سایر افراد سیگاری بکنید. هنگامی که دخانیات را ترک می‌کنید، احتمال کمتری وجود دارد که فرزندان شما دخانیات مصرف کنند و اگر قبلاً سیگار می‌کشیدند احتمال ترک آن بیشتر می‌شود.

چگونه اعتماد به نفس خود برای ترک را تقویت کنید

بسیاری از مصرف‌کنندگان دخانیات از ترک دخانیات می‌ترسند زیرا در گذشته سعی در ترک آن داشتند و موفق نبودند. آنها فکر می‌کنند که ترک کردن کار خیلی سخت خواهد بود زیرا معتقد هستند که نمی‌توانند بر علائم ترک غلبه کنند، احساس می‌کنند هیچ حمایتی ندارند یا فقط فکر می‌کنند که توانایی موفق شدن را ندارند. در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به بهبود اعتماد به نفس شما وجود دارد:

۱. تلاش کنید که مصرف دخانیات را ترک کنید و به مدت یک روز دخانیات مصرف نکنید، سپس به مدت دو روز سیگار نکشید و به همین صورت ادامه دهید.

۲. از الگوهای نقش پیروی کنید. اطرافیان خود را که اخیراً ترک کرده‌اند مشاهده کنید و رفتارهای آنها را تمرین کنید. از کدام یک از عمل‌ها و عکس‌العمل‌های آنها می‌توانید پیروی کنید؟ فقط در ایالات متحده، تقریباً ۵۰ میلیون سیگاری، مصرف دخانیات خود را با موفقیت ترک کرده‌اند.

۳. به هر کدام از تلاش خود برای ترک به عنوان یک فرایند یادگیری نگاه کنید. هر بار، یاد می‌گیرید چه چیزی برای شما مفید نیست و چگونه می‌توانید دفعه بعد موفق تر شوید. باید بدانید که افراد مصرف‌کننده دخانیات قبل از اینکه موفق شوند ترک کنند چندین بار برای ترک تلاش می‌کنند و این یک چیز مشترک در بین افراد سیگاری است که می‌خواهند ترک کنند و در نهایت آنها موفق می‌شوند.

۴. روحیه منفی خود را نسبت به ترک اعتیاد بهبود ببخشید. بسیاری از مصرف‌کنندگان دخانیات ترس، استرس و اضطراب را با تلاش برای ترک دخانیات مرتبط می‌دانند. با این حال، اگر خود را با حمایت مناسب، مانند دوستان و خانواده احاطه کرده و با خوب غذا خوردن، ورزش و خواب کافی، یک سبک زندگی سالم را حفظ کنید، متوجه می‌شوید که هرگونه استرس، ترس یا اضطرابی را که پیش‌بینی کرده بودید را می‌توان به درستی مدیریت کرد.

برنامه ریزی و تلاش برای ترک

این کار فوق العاده ای است که تصمیم به ترک گرفته‌اید. مصرف دخانیات نمی‌تواند با ارزش‌ها، اولویت‌ها و اهدافی مانند زندگی طولانی‌تر، زندگی بهتر و الگوی خوب برای بچه‌ها مطابقت داشته باشد. شما در حال انتخاب تغییر مثبت برای خودتان هستید. ترک با اولین اقدامی که انجام می‌دهید شروع می‌شود: تهیه برنامه ترک کردن. در اینجا می‌توانید مراحل مشاوره و لیستی از منابع حمایتی را برای کمک به برنامه ریزی و تلاش برای ترک خود پیدا کنید. همیشه به یاد داشته باشید تا زمانی می‌توانید موفق باشید و ترک کنید که اهداف خود را در معرض دیدتان قرار دهید و به آن نگاه بندازید.

تدوین یک برنامه ترک

اولین قدم شما برای ترک، تهیه برنامه ترک است. در اینجا عناصر اصلی یک برنامه ترک موفقیت‌آمیز آورده شده است.

۱- تاریخ ترک را تعیین کنید: تعیین تاریخ ترک در اسرع وقت مهم است. اختصاص دادن یک مدت کوتاه برای ترک، شما را متمرکز و با انگیزه می‌کند تا به هدف خود برسید. انتخاب روز تولد یا روز معنادار دیگر ایده خوبی است، اما لازم نیست همیشه از این روند پیروی کنید. شما می‌توانید از همین امروز ترک دخانیات را شروع کنید!

۲- از دوستان، خانواده و همکاران خود استفاده کنید: مهم است که هدف خود برای ترک را با کسانی که مرتباً در ارتباط هستید، به اشتراک بگذارید.

● از آنها حمایت بخواهید. آنها می‌توانند با یادآوری هدف شما در ترک، شما را حمایت و تشویق کنند که در برابر وسوسه‌هایی مانند هوس مصرف دخانیات مقاومت کنید. با گفتن به دوستان، خانواده و همکاران خود ممکن است به کسانی که دخانیات مصرف می‌کنند نیز القا کنید تا یک برنامه ترک دخانیات برایتان ایجاد کنند. داشتن یک «رفیق ترک» روشی عالی برای پاسخگویی به هر دو در مسیر ترک دخانیات است.

● از آنها بخواهید درک تان کنند. اگر دوستان یا خانواده‌ای دارید که دخانیات مصرف می‌کنند، بهتر است از آنها بخواهید هنگامی که در خانه حاضر هستید از مصرف دخانیات خودداری کنند!

۳- پیش‌بینی چالش‌های آینده تلاش ترک: ترک دخانیات کار ساده‌ای نیست، بنابراین شما برای تعهد به این هدف باید شجاع باشید! مهم این است که در تلاش‌های آینده، به ویژه در هفته‌های حساس اول، عوامل محرک و چالش‌ها را پیش‌بینی کنید. چند روز و هفته اول به دلیل علائم بالقوه ترک نیکوتین و همچنین موانع ایجاد شده در ترک هر



عادت، سخت ترین زمان خواهد بود .

۴- محصولات دخانی را از محیط خود دور کنید: به حداقل رساندن نشانه‌های عود مصرف دخانیات مهم است. اگر محصولات دخانی هنوز در اطراف شما موجود است، شما بیشتر وسوسه می شوید که دخانیات مصرف نکنید. بهتر است با ساختن خانه ای بدون دود، اجتناب از مناطق سیگار کشیدن و درخواست از همسالان خود که در اطراف شما دخانیات مصرف نکنند، خود را از چنین وسوسه هایی خلاص کنید. اگر با افراد سیگاری دیگری که هنوز آماده ترک سیگار نیستند زندگی می کنید، از آنها بخواهید در بیرون از خانه و اتومبیل دخانیات مصرف کنند تا به بهترین وجه به محیط عاری از دود برسید.

استراتژی‌ها و مهارت های غلبه بر موانع مشترک و چالش های ترک

برای اینکه شما برنامه ترک خود را با موفقیت تدوین و اجرا کنید، مهم است که خود را با چالش‌ها و موانع پیش رو برای ترک و راهکارها و مهارت های مقابله ای موثر با آن آشنا کنید. چالش‌های ترک اعتیاد به طور معمول در سه دسته تقسیم می شوند: وابستگی جسمی، وابستگی رفتاری، اجتماعی و وابستگی روانی یا عاطفی.

اعتیاد فیزیکی

نیکوتین، ماده شیمیایی مضر در محصولات تنباکو، یک ماده اعتیاد آور است. این سیستم مانند هروئین و کوکائین بر سیستم های دوپامین در مغز تأثیر می گذارد: نیکوتین تعداد گیرنده های نیکوتین را در مغز افزایش می دهد. به عنوان یک سیگاری، مغز و بدن به عملکرد در سطح خاصی از نیکوتین عادت می کند. سطح نیکوتین یک یا دو ساعت پس از آخرین سیگار به طرز چشمگیری کاهش می یابد (چه برای ترک سیگار یا وقفه های طبیعی بین استعمال دخانیات)، و سپس میل به نیکوتین زیاد می شود. هنگام ترک، مهم است که به یاد داشته باشید عدم وجود نیکوتین در مغز افراد را ناراحت می کند و علائم ترک را ایجاد می کند.

علائم ترک نیکوتین به تغییرات جسمی و روحی اشاره دارد که ممکن است در اثر توقف ناگهانی مصرف دخانیات ایجاد شود مانند سردرد، سرفه، ولع مصرف، افزایش اشتها یا



هفته ملی بدون دخانیات

۱۴۰۰ خردادماه

افزایش وزن، تغییرات خلقی (غم، تحریک پذیری، ناامیدی یا عصبانیت)، بی قراری، کاهش ضربان قلب، مشکلات تمرکز، علائم شبه آنفلوآنزا و بی خوابی. خبر خوب این است که علائم به طور معمول موقتی هستند (۲-۴ هفته) و با عادت دوباره بدن، نحوه عملکرد بدون مقادیر بالای نیکوتین فروکش می کنند. همچنین روش های موثری در دسترس است که کمک می کند بر آنها غلبه کنید.

ترک کردن سیگار لزوماً به این معنی نیست که شما قرار است تمام علائم ترک را تجربه کنید، اما مهم این است که خود را برای این احتمالات آماده کنید. برای مقابله با علائم ترک نیکوتین دو روش وجود دارد: درمان های شناختی- رفتاری و درمان های دارویی/ پزشکی. در جداول زیر، اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی استفاده از مکانیسم های مقابله ای شناختی- رفتاری و دارویی برای غلبه بر علائم ترک نیکوتین ارائه شده است.

درمان های شناختی- رفتاری

درمان های شناختی- رفتاری می تواند به طور موثر به افراد مصرف کننده دخانیات کمک کند علائم ترک را کاهش دهند. جدول یک مداخلات شناختی یا رفتاری پیشنهادی را ارائه می دهد.



جدول شماره یک: درمان های شناختی - رفتاری

علائم ترک	درمان شناختی - رفتاری
سردرد	اگر مرتباً سردرد دارید، مطمئن شوید که به اندازه کافی می خوابید، مرتب غذا می خورید و فعالیت بدنی دارید. این تغییرات در سبک زندگی باید به حفظ سردرد کمک کرده و یا شدت آن را کمتر کند.
سرفه کردن	هیدراته ماندن (نوشیدن آب به مقدار کافی) برای کنترل هر نوع سرفه ای موثر باشد. یک قاشق عسل، چای گرم، آب میوه مصرف کنید و از مصرف لبنیات پرهیز کنید.
هوس و ولع	چهار استراتژی زیر را برای مقابله با ولع مصرف دخانیات در نظر بگیرید. (۱) تأخیر: قبل از اینکه تسلیم مصرف دخانیات شوید، محدودیت زمانی تعیین کنید. تا می توانید تأخیر کنید. اگر احساس می کنید باید تسلیم اصرار خود شوید، به مرحله ۲ بروید. (۲) تنفس عمیق: ۱۰ نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. سعی کنید با نفس عمیق به خودتان آرامش بدهید تا زمانی که اشتیاق از بین برود و از درون خود را آرام کنید. اگر اشتیاق فروکش نکرد، به مرحله بعدی بروید. (۳) نوشیدن آب: نوشیدن آب یک جایگزین سالم برای قرار دادن سیگار در دهان است. آب همچنین باعث دفع سموم و شادابی بدن می شود. اگر هنوز هوس سیگار می کنید، به مرحله بعدی بروید. (۴) برای حواس پرتی خود کار دیگری انجام دهید: مطالعه کنید، پیاده روی کنید، موسیقی گوش دهید، تلویزیون تماشا کنید و به غیر از مصرف دخانیات به سرگرمی دیگری بپردازید.
افزایش اشتها یا افزایش وزن	افزایش وزن یکی از رایج ترین سد معبرها و عوارض جانبی است که باعث خروج سیگاری هایی می شود که سعی در ترک آن دارند. درست است که وقتی دخانیات را ترک می کنید، اشتهای تان بیشتر می شود و وسوسه می شوید دخانیات را با غذا جایگزین کنید. با این حال، می توانید با انتخاب گزینه های تغذیه سالم (میوه ها، سبزیجات و سایر میان وعده های سالم) و نوشیدن مقدار زیادی آب، از افزایش وزن جلوگیری کنید، این امر همچنین به شما کمک می کند گام مهمی در جهت یک سبک زندگی سالم نیز بردارید!
تغییرات خلق و خو (غم، تحریک پذیری، ناامیدی یا عصبانیت)	سعی کنید بر روی افکار مثبت در مورد ترک و یا مشغول کردن افکار خود به موسیقی شاد و نشاط آور تمرکز کنید تا افکار و احساسات منفی را که تجربه می کنید غرق کنید. تمام مزایای ترک دخانیات را به خود یادآوری کنید. به این فکر کنید که از نظر جسمی چقدر احساس بهتری خواهید داشت و به تمام انرژی اضافی که پیدا خواهید کرد فکر کنید.

علائم ترک	درمان شناختی- رفتاری
بی قراری	بهترین راه برای مقابله با بی قراری تحرک و حرکت است. به فعالیت بدنی بپردازید و قدم بزنید.
کاهش ضربان قلب	به یادداشت زیر مراجعه کنید.
مشکل در تمرکز	بهترین راه برای مقابله با مشکلات تمرکز حواس شماست. یوگا، مدیتیشن و تصاویر ذهنی روش‌های عالی بر تمرکز و بازیابی توانایی‌های شما برای عملکرد طبیعی است. فکر کردن مانند ورزشی برای ذهن شماست! تنها راه برای بهبود تمرکز تمرین آن است.
علائم شبه آنفولانزا	همانند هر مورد آنفولانزا یا سرماخوردگی، بهترین «دارو» استراحت و آبرسانی است. به نوشیدن آب ادامه دهید و اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی خوابیده اید.
بی خوابی	روش‌های آرام سازی و ورزش منظم برای غلبه بر مشکل خواب شما خوب است. اقدامات معمول برای غلبه بر بی خوابی همچنین شامل شمارش گوسفندان، مراقبه هدایت شده و تصاویر خود هدایت شونده است.

توجه: همه علائم را می توان با یک سبک زندگی سالم کنترل کرد. اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی غذا می خورید و می خوابید، یک مولتی ویتامین مصرف کنید، ورزش کنید، گزینه های خوبی برای غذا خوردن انتخاب کنید، مکانیزم های آرام سازی را ایجاد کنید (اعم از استفاده از یک توپ استرس، تنفس عمیق، یوگا، یا چیزی که خودتان ایجاد می کنید) و خود را با چیزهایی پاداش دهید مانند کتاب جدید یا حمام گرم نه تنها به آرامش شما کمک می کند، بلکه شما را از اصرارها و هوس های فعلی منحرف می کند.





درمان های دارویی

علاوه بر روش های درمانی رفتاری، روش های درمانی دارویی نیز برای کمک به غلبه بر علائم ترک نیکوتین وجود دارد. دو نوع دارو عمده وجود دارد که ممکن است بتواند علائم ترک را تسکین دهد: درمان های جایگزین نیکوتین (NRT) و درمان های جایگزین غیر نیکوتین. NRT شامل مواردی مانند آدامس و برچسب نیکوتین است در حالی که درمان های غیر نیکوتین شامل داروها مانند بوپروپیون و وارنیکلین است.

ارتباطات عاطفی / روانشناختی

شاید این را متوجه نشده باشید اما به عنوان یک سیگاری، دخانیات را با عواطف، افکار و باورهای خاصی مرتبط می کنید. بخشی از ترک شامل قطع ارتباطات ناخودآگاه است. برخی از ارتباطات متداول که افراد سیگاری تشکیل می دهند شامل سیگار کشیدن در هنگام احساس استرس، خوشحالی، ناراحتی یا عصبانیت است. در واقع استفاده از سیگار برای کنار آمدن با این احساسات اشتباه است. این به حل مشکلات شما کمک نمی کند. علاوه بر ارتباط عواطف یا احساسات با سیگار کشیدن، ارتباط باورهای خاص با سیگار کشیدن نیز معمول است. این اعتقادات شامل موارد زیر است:

● «سیگار کشیدن به من کمک می کند تا آرام شوم.»

● «سیگار کشیدن واقعا مضر نیست!»

● «سیگار کشیدن مرا آرام می کند!»

● «سیگار کشیدن باعث کاهش وزن من می شود.»

به منظور اینکه از چنین موانع احساسی یا روانی جلوگیری شود، مهم است که به یاد داشته باشید و خود را از خطرات مصرف دخانیات و مزایای ترک آن آگاه کنید. شما می توانید خودکامگی مثبت را بر اساس مزایای ترک دخانیات مانند «ترک دخانیات می تواند زندگیم را نجات دهد» و «ترک دخانیات می تواند پول من را ذخیره کند» ایجاد کنید، تا به شما کمک کند ارتباط بین ترک و باورهای منفی را از بین ببرید.

ارتباطات رفتاری و اجتماعی

مصرف دخانیات شما یک عادت شده است - یک عادت اعتیاد آور. این به شدت به فعالیت های روزمره شما وابسته است. برای ترک دخانیات، یک بار دیگر این پیوندهای ارتباطی را که عادت را تشکیل داده اند، بشکنید. مصرف دخانیات شما ممکن است با عادات یا رفتارهای دیگری مانند تماشای تلویزیون، صحبت از طریق تلفن، غذا خوردن و

معاشرت با دوستان همراه باشد. در زیر چند پیشنهاد در مورد چگونگی شروع شکستن پیوندهای مصرف دخانیات و برخی رفتارها وجود دارد.

پیشنهاد برای شکستن پیوند	فعالیت / رفتار
<p>بلافاصله بعد از غذا خوردن فعالیت جدیدی را شروع کنید. خود را از وسوسه ها و اصرارها منحرف کنید. ظرفها را بشویید، ورزش کنید، مطالعه کنید یا کارهای منزل را انجام دهید. این موارد چند نمونه از فعالیت ها است.</p>	<p>ارتباط مصرف دخانیات با غذا خوردن</p>
<p>تا زمانی که دخانیات را با موفقیت ترک نکنید از این شرایط کناره گیری کنید. لازم نیست با همه دوستان خود ارتباط تان را قطع کنید، فقط از رفتن به بیرون برای صرف شام با آنها خودداری کنید تا زمانی که در تعهد خود در امر قاطع باشید.</p>	<p>مصرف دخانیات به عنوان یک فعالیت اجتماعی (در حالی که با دوستان یا همکاران هستید)</p>
<p>این یک باور غلط رایج است که بسیاری از افراد سیگاری معتقدند. سیگار کشیدن هیچ ارتباطی با تسکین استرس ندارد. با این حال، روشهای زیادی برای مقابله با استرس وجود دارد. آب یا چای بنوشید، یک توپ استرس را حمل کنید تا دستان شما مشغول باشد، برای رفع استرس تنفس عمیق یا ورزش کنید.</p>	<p>سیگار کشیدن به عنوان تسکین دهنده استرس</p>
<p>برای جلوگیری از وسوسه، همه سیگارها را از اتومبیل بردارید، به موسیقی گوش دهید، با وسایل حمل و نقل عمومی و یا با همسفر همراه شوید.</p>	<p>سیگار کشیدن در ماشین</p>
<p>در حالی که مشغول تلفن هستید، به فعالیت دیگری بپردازید. خواه بازی با یک توپ استرس باشد، یا راه رفتن در اطرافتان، خود را از تمایل به سیگار کشیدن منحرف کنید.</p>	<p>سیگار کشیدن در حالی که مشغول صحبت با تلفن هستید.</p>



این مهم است که همیشه هدف نهایی خود را در راس ذهن خود قرار دهید تا از عادت‌های مرتبط خود خارج نشوید. اگر متوجه شدید که مصرف دخانیات را هوس می‌کنید، بلند شده و هرچه که اطرافتان مرتبط باشد از خود دور کنید! آنچه را که باید، انجام دهید تا حواس تان را پرت کنید تا این که عادت‌های وابسته باعث ایجاد حرص مصرف دخانیات نشوند. به طور معمول هوس‌ها و اصرارها کوتاه مدت هستند و فقط ۱ تا ۲ دقیقه طول می‌کشد. این سه دسته از موانع ذکر شده اگرچه مجزا هستند اما لزوماً موانعی جداگانه نیستند. موفقیت در مقابله با علائم یک گروه می‌تواند به شما کمک کند تا با علائم دسته‌های دیگر نیز مقابله کنید. هر تلاش برای ترک دخانیات منحصر به فرد سیگاری است که سعی در ترک آن دارد و شما ممکن است با چالش‌ها و موانعی روبرو شوید که در اینجا ذکر نشده است، ممکن است همه آنها را تجربه کنید یا هیچ یک از آنها را تجربه نکنید.

هفته‌ای

بدون دخانیات

۱۴۰۰ تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰



آماده شدن برای عود

هر اقدام ترک یک گام مثبت در جهت درست به سمت ترک دائمی است. ممکن است چندین بار تلاش برای ترک داشته باشد، اما هر بار که تلاش خود را برای ترک مجدد از سر می گیرید، از مسیر درست دور شوید و توقف دفعه بعدی را برای شما آسان تر می کند. عود کردن و اشتباه کردن کاملاً طبیعی است. اجازه ندهید که عود مانع از اعتماد به نفس شما شود - عود به معنی شکست نیست. از هرگونه عود به عنوان یک تجربه یادگیری در چگونگی توسعه مهارت های بهتر مقابله و تلاش های بیشتر در آینده برای اطمینان از موفقیت بیشتر استفاده کنید. بهترین راه پیشگیری از عود، استفاده از روش های درمانی موثر است. درمان های موثر تأیید شده شامل مواد خودپار است. مشاوره از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، مشاوره رفتاری فردی، مشاوره رفتار گروهی، مشاوره تلفنی، مسابقات «ترک کردن و برنده شدن» و داروهای فوق الذکر می باشد.

برای جلوگیری از عود، باید استفاده از روش های درمانی تایید نشده اجتناب کرد. بسیاری از جوامع درمان های متداول و جایگزینی مانند سیگار الکترونیکی، طب سوزنی، لیزر درمانی و سایر اقدامات جایگزین را ارائه می دهند. این روش های درمانی جایگزین ادعای کمک به تلاش های ترک را دارند اما هیچ مدرک کافی وجود ندارد که بتوان میزان ترک را بهبود بخشید و موفقیت در ترک را افزایش دهد.





من ترک قلیان



هفته ملی

بدون دخانیات

۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ خردادماه

منابع حمایتی محلی برای ترک دخانیات

اگر علاقه مند به پیدا کردن منابع بیشتر در مورد اهمیت ترک، چگونگی کسب اعتماد به نفس بیشتر در ترک و نحوه ترک موفقیت آمیز دخانیات هستید، پیشنهاد می کنیم در جامعه خود بخ دنبال سایر منابع موجود باشید. منابع زیادی در جامعه شما وجود دارد مانند گروههای پشتیبانی، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و تلفن های گویا ترک دخانیات (خطوط تلفنی رایگان) که می توانند شما را برای ترک حمایت کنند. همچنین ممکن است منابع آنلاین مفیدی پیدا کنید.

1. WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: implementing smoke-free environments. Geneva, World Health Organization, 2009. (<http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/en/>, accessed 15 November 2012).
2. WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. Geneva, World Health Organization, 2011. (http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/, accessed 15 November 2012).
3. East Tennessee State University. If you are not yet ready to quit. (<http://www.etsu.edu/tips/education/notready.aspx>, accessed 15 November 2012).
4. Cancer Council New South Wales. The impacts of smoking and the benefits of quitting. (<http://askthequestion.com.au/wp-content/uploads/201111/CAN3249-The-impacts-of-smoking-with-references.pdf>, accessed 15 June 2013).
5. WHO Capacity Building for Tobacco Control Training Package 4: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care. Geneva, World Health Organization, 2013. (http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/index.html, accessed 15 June 2013).
6. Nishori R, Weaver R. What are the physical, social and financial affects of smoking. (<http://www.lshtm.ac.uk/aboutus/introducing/volunteering/pastprojects/10projects/1102reeceandrisanpresentation.pdf>, accessed 15 June 2013).
7. Fiore MC et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Clinical practice guideline. Rockville, MD, Department of Health and Human Services, 2008. (www.ahrq.gov/clinic/tobacco/treating_tobacco_use08.pdf, accessed 15 November 2012).



تعمد من، ترک قلیان

تبسم

ماهانه واغندازی بیمه شدگان ازمان بیمه سلامت ایران

روز جهانی فشارخون
World Hypertension Day
روز جهانی فشارخون (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)

راز عمری هولاتی تر:
اندازه گیری دقیق
فشار خون و کنترل آن

اخبار سلامت

تغذیه مناسب برای بیمه شدگان مبتلا به دیابت
معمولاً هرگز از شکم‌های گرسنه دیده‌اند. اما در این روزها، گرسنگی را با یک بشقاب میوه و سبزیجات تازه و یک لیوان شیر میوه‌ای می‌توانند جایگزین کنند. این میوه‌ها و سبزیجات را با یکدیگر ترکیب کنید تا یک وعده غذایی متعادل و سالم داشته باشید.

تغذیه مناسب برای بیمه شدگان مبتلا به فشارخون
معمولاً هرگز از شکم‌های گرسنه دیده‌اند. اما در این روزها، گرسنگی را با یک بشقاب میوه و سبزیجات تازه و یک لیوان شیر میوه‌ای می‌توانند جایگزین کنند. این میوه‌ها و سبزیجات را با یکدیگر ترکیب کنید تا یک وعده غذایی متعادل و سالم داشته باشید.

تغذیه مناسب برای بیمه شدگان مبتلا به چربی خون
معمولاً هرگز از شکم‌های گرسنه دیده‌اند. اما در این روزها، گرسنگی را با یک بشقاب میوه و سبزیجات تازه و یک لیوان شیر میوه‌ای می‌توانند جایگزین کنند. این میوه‌ها و سبزیجات را با یکدیگر ترکیب کنید تا یک وعده غذایی متعادل و سالم داشته باشید.

پوشش های آموزش سلامت

و همه پوشش های آموزش سلامت را در اختیار دارید.

بسته های آموزش سلامت

این بسته‌ها شامل محتوای آموزشی است. اینجا کلیک کنید.

فیلم های آموزش سلامت

این محتوای آموزشی به شما کمک می‌کند تا بیشتر بدانید. اینجا کلیک کنید.