



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۳۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر رضوی

دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور و مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سلامت

موضوع: پاسخ به استعلام اندیکاسیون های درمانی واکسن پنوموکوک

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۲/۷۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ در خصوص اندیکاسیون های درمانی واکسن پنوموکوک، به استحضار می رساند علیرغم مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی مبنی بر لزوم ادغام واکسن مذکور در برنامه کشوری ایمن سازی، تاکنون این واکسن به برنامه جاری ایمن سازی اضافه نشده است. گروه های پرخطر واجد شرایط دریافت واکسن بر اساس آخرین منابع علمی معتبر به شرح ذیل می باشد:

۱- افراد تا سن ۱۸ سالگی:

گروه الف: این گروه لازم است با توجه به سن، ۳-۱ نوبت PCV13 دریافت نمایند و ۸ هفته بعد از آخرین نوبت PCV13 یا زمانی که حداقل سن فرد ۲۴ ماه تمام است، یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند. گروه الف شامل موارد ذیل است:

- بیماری مزمن قلبی (بخصوص بیماری سیانوتیک مادرزادی و نارسایی قلبی)
- بیماری مزمن ریوی (شامل آسم تحت درمان با استروئید خوراکی با دز بالا)
- دیابت قندی
- بیماری مزمن کبد
- کاشت حلزون



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۳۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

گروه ب: این گروه لازم است با توجه به سن ، ۳-۱ نوبت PCV13 دریافت نمایند و ۸ هفته بعد از آخرین نوبت PCV13 یا زمانی که حداقل سن فرد ۲۴ ماه تمام است ، یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند و ۵ سال بعد مجدداً یک نوبت PPSV23 تکرار شود. گروه ب شامل موارد ذیل است :

- سیکل سل و سایر هموگلوبینوپاتی ها
- نقایص مادرزادی و آناتومیک و عملکردی طحال
- نقایص مادرزادی و اکتسابی ایمنی مانند HIV ، لوسمی ، نئوپلاسم های بدخیم و افراد تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و رادیوتراپی ، پیوند عضو ، پیوند مغز استخوان و
- نارسایی مزمن کلیه
- سندرم نفروتیک
- ۲- افراد ۱۹ سال به بالا

گروه الف: این گروه لازم است یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند. گروه الف شامل موارد ذیل است:

- بیماری مزمن قلبی (بجز پرفشاری ایزوله خون)
- بیماری مزمن ریه (از جمله مصرف سیگار)
- بیماری مزمن کبد (از جمله الکلیسم)
- دیابت قندی

گروه ب: این گروه لازم است ۱ نوبت PCV13 دریافت نمایند و ۸ هفته بعد یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند و ۵ سال بعد مجدداً یک نوبت PPSV23 تکرار شود. گروه ب شامل موارد ذیل است :

- سیکل سل و سایر هموگلوبینوپاتی ها



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۳۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

- نقایص مادرزادی و آناتومیک و عملکردی طحال
 - نقایص مادرزادی و اکتسابی ایمنی مانند HIV ، لوسمی ، نئوپلاسم های بدخیم و افراد تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و رادیوتراپی ، پیوند عضو ، پیوند مغز استخوان و ...
 - نارسایی مزمن کلیه
 - سندرم نفروتیک
- گروه ج: این گروه لازم است ۱ نوبت PCV13 دریافت نمایند و ۸ هفته بعد یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند .
- گروه ج شامل موارد ذیل است :
- نشست مایع مغزی نخاعی
 - کاشت حلزون
- نکته ۱: در افرادی که پیوند مغز استخوان دریافت کرده اند ، بدون توجه به سن ، دریافت ۲ نوبت PCV13 ضروری است.
- نکته ۲: در تعدادی از کشورها به افراد ۶۵ ساله و بالاتر توصیه می شود بر اساس نظریه پزشک ، حتی بدون مشکل زمینه ای یک نوبت PCV13 و یک نوبت PPSV23 دریافت نمایند.
- نکته ۳: حداقل سن دریافت PCV13 شش هفته تمام و حداقل سن دریافت PPSV23 ، ۲۴ ماه تمام است.

دکتر محمد مهدی گویا
ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر