

انتقال به انسان

کشتار دام در فضای خارج از کشتارگاه به انسان منتقل می شود



خون آلوده



نیش حشرات



گزش گنه آلوده



بیه کردن گنه



دام های آلوده



تماس با لاشه

همه چیز درباره بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نوعی بیماری مشترک بین حیوان و انسان است که به طور ناگهانی شروع میشود

منبع : واحد مبارزه با بیماری ها مرکز بهداشت شهرستان چابهار

علائم بیماری

که خود را بین ۱ تا ۹ روز بعد از آلودگی به ویروس، نشان میدهد



دردهای عضلانی



سرگیجه و بی حالی



تب و گلودرد



اسهال و استفراغ



کمردرد و گردن درد



حساسیت به نور

مشاغل در خطر بیماری



کارگران کشتارگاهها و قصابی ها



دامداران و چوبداران



تکنسین های دامپزشکی



زنان خانه دار



شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار
روابط عمومی

CCHF



راه های پیشگیری



نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت ، جگر و احشام ۴۸ ساعت در دمای یخچال ۲ تا ۸ درجه

پرهیز از مصرف گوشت دام به صورت خام و نیم پز



پرهیز از ذبح دام در منزل و مراکز غیر بهداشتی

رعایت کامل حفاظت فردی هنگام تماس با دام



این بیماری در دام ، هیچ علائمی ندارد

تاخیر در درمان آن ، موجب فوت میشود



Chabahar_health



Chabahar.health

Irshums.ac.ir



CHABAHAH HEALTH

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

(CCHF)

علائم بیماری:

- تب ناگهانی
- درد عضلانی
- سردرد
- وجود خونریزی از اعضای بدن



راه های اصلی انتقال بیماری:

- گزش توسط کنه یا لاله کردن آن
- تماس مستقیم با خون و بافت های دام آلوده حین ذبح دام (گوسفند، گاو و ...)
- تماس مستقیم با خون و ترشحات بیمار بستری در بیمارستان

راه های پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو:

- خودداری از خرید گوشت فاقد مهر دامپزشکی
- بهرتر است گوشت تازه به مدت ۲۴ ساعت و سایر امعاء و احشای (دل و جگر و...) به مدت ۴۸ ساعت در دمای معمولی یخچال (۸ تا ۲ درجه) نگهداری شود.
- خودداری از ذبح دام در منزل یا معابر
- استفاده از دستکش در هنگام خورد کردن گوشت و دل و جگر
- استفاده از وسایل ایمنی فردی شامل کلاه، عینک، ماسک، روپوش، چکمه، دستکش لاستیکی در موقع تماس با دام و ذبح دام بخصوص برای سلاخان و قصابان
- تعویض لباس پس از تماس با دام و بعد از خروج از محل نگهداری دام
- دامداران، چوبداران و کشاورزان بهتر است در هنگام تماس با دام خود را از گزش کنه محافظت کنند.
- سمپاشی بر علیه کنه در مناطق روستایی

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)



تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از بیماری های ویروسی مشترک بین انسان و دام بوده و مخزن اصلی آن، ویروس کنه سخت می باشد.

مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه از بین می رود و در خون به مدت ۱۰ روز در دمای ۴۰ درجه مقاومت می کند.

ویروس در برابر ضد عفونی کننده ها خصوصاً ترکیبات اسیدی مقاومت ندارد، بنابراین در محیط اسیدی ایجاد شده پس از جمود نعشی در گوشت از بین می رود.

علائم بیماری در دام :

- دامها بندرت علائم کلینیکی نشان می دهند.
- در اثر عفونت خونی، تب به مدت یک هفته در دام دوام می یابد و پس از آن دام به عنوان ناقل بیماری، ویروس را از خود دفع می کند.
- گهگاهی در حالت حاد در مخاطات، پر خونی یا خون ریزی دیده می شود.

علائم بیماری در انسان :

- تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد، درد شدید عضلات، بی اشتها، درد پشت
- حلقه چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد، دل درد
- تغییرات خلقی مثل بیقراری و افسردگی



راههای انتقال به دام :

- انتقال از طریق گزش کنه ای از گونه هیالوما
- انتقال از طریق تماس با خون یا ترشحات مبتلایان

راههای انتقال به انسان :

- انتقال از طریق گزش کنه آلوده
- از طریق له کردن کنه
- تماس مستقیم با لاشه گوشت، خون، ترشحات و بافتهای آلوده
- تماس با ترشحات، خون و تنفس افراد مبتلا
- تنفس در تماس با دام های آلوده

گروههای در معرض خطر:

همه افراد جامعه احتمال ابتلا به بیماری را دارند. گروه های پر خطر شامل:



- دامداران و چوبداران
- دامپزشکان و کارکنان دامپزشکی ها
- سلاخان، قصابان و کارکنان کشتارگاه ها
- پزشکان، پرستاران، بهیاران و کارکنان بیمارستان ها
- کارکنان رستوران ها و کبابی ها

دوره کمون:

دوره بدون علامت بیماری معمولاً از یک تا سه روز و حداکثر ۹ روز به طول می انجامد که به دنبال تماس با بافتها یا خون آلوده تا ۱۳ روز نیز گزارش شده است.

پیشگیری از بیماری در دام ها:

- بهسازی جایگاه دام جهت جلوگیری از تخمگذاری و تکثیر کنه ها
- سمپاشی بدن و جایگاه دام ها بخصوص در فصل فعالیت کنه ها
- جمع آوری کود و فضولات دامی و خارج نمودن از دامداری
- پاکسازی دامداری از اشیاء متفرقه جهت جلوگیری از تخمگذاری کنه
- عدم خرید دام از کانونهای بیماری و دامداری هایی که موازین بهداشتی را رعایت نمی کنند
- سم پاشی بدن دام های خریداری شده و قرنطینه به مدت ۱۴ روز

پیشگیری بیماری در انسان :



- جدا نگاه داشتن جایگاه دام از محل زندگی
- خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام
- خودداری از تماس بدن با ترشحات و خون دام
- خودداری از کشتار دام در محلهای غیر مجاز
- تهیه گوشت مورد نیاز از محلهای مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی
- نگهداری گوشت تازه به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و سپس استفاده
- روشهای حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان (پوشیدن دستکش ، لباس بلند، چکمه، ماسک و عینک)
- روشهای حفاظت شخصی از گزش کنه و حشرات
- خودداری از رفت و آمد در محلهای کشتار غیر مجاز
- اجتناب از خوردن جگر خام و نیم پخته. نگهداری جگر، قلب، کلیه به مدت ۴۸ ساعت در یخچال و سپس استفاده از آن
- آموزش افراد در معرض خطر و اطلاع رسانی عمومی
- رعایت اصول ایمنی درموقع تماس باگوشت تازه،جگر و سایرآلایش دام

دفن بهداشتی اجساد:

- توصیه می شود از دستکش ضخیم لاستیکی به عنوان جفت دستکش دوم (لایه رومی) استفاده شود.
- محلول ۰/۱ درصد را به جسد و اطرافش پاشیده شود.
- جسد را در کیسه مخصوص جنازه قرار داده و محکم بسته شود.
- محلول سفید کننده ۰/۱ را به کیسه جنازه پاشیده شود.
- اگر کیسه مخصوص جنازه در دسترس نیست جنازه را در پارچه کتانی دو لایه آغشته به محلول ۰/۱ سفید کننده پیچیده سپس کاملاً نایلون پیچ شود یا با نوار چسب پلاستیکی کاملاً بسته شود.



شبکه بهداشت و درمان بهارستان

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها (تلفن ۰۱۴۰۳۲۱۵۶)